

# La Sociedad Americana Contra El Cáncer publica las nuevas estadísticas sobre el cáncer colorrectal; los cambios rápidos hacia enfermedades más avanzadas y las personas más jóvenes

**ATLANTA, 1 de marzo de 2023** – El cáncer colorrectal está cambiando con rapidez a una enfermedad más avanzada y en personas más jóvenes según las Estadísticas del cáncer de 2023, un nuevo informe sobre datos y tendencias del cáncer de la [Sociedad Americana Contra el Cáncer](#) (ACS, por sus siglas en inglés). Los investigadores demostraron que la proporción de personas en los Estados Unidos diagnosticadas con cáncer colorrectal (CRC, por sus siglas en inglés) en etapa avanzada aumentó de 52% a mediados de la década de 2000 a 60% en 2019. Además, los diagnósticos de personas menores de 55 años se duplicaron del 11% (1 de cada 10) en 1995 al 20% (1 de cada 5) en 2019. En general, en 2023, aproximadamente 153,020 personas serán diagnosticadas con CRC en los EE. UU., y 52,550 personas morirán a causa de la enfermedad. Estos importantes hallazgos se publicarán hoy en [CA: A Cancer Journal for Clinicians](#), junto con su suplemento fácil de usar, *Colorectal Cancer Facts & Figures 2023-2025 (Datos y estadísticas sobre el cáncer colorrectal 2023-2025)*, disponible en [cancer.org](#). (los hipervínculos se incluirán en la versión final)

“Sabemos que las tasas están aumentando en las personas jóvenes, pero es alarmante ver con qué rapidez toda la población de pacientes se está volviendo más joven, a pesar de la disminución en número de la población en general,” dijo [Rebecca Siegel](#), directora científica principal, investigación de vigilancia de la Sociedad Americana Contra el Cáncer, y autora principal del informe. “La tendencia hacia una enfermedad más avanzada en personas de todas las edades también es sorprendente y debe motivar a todas las personas de 45 años de edad en adelante a hacerse las pruebas”.

El CCR es el tercer cáncer más comúnmente diagnosticado y la tercera causa principal de muerte por cáncer tanto en los hombres como en las mujeres en los EE. UU. La incidencia del CCR disminuyó rápidamente en las personas de 50 años o más durante la década de 2000, en gran medida debido al aumento de las pruebas de detección con colonoscopia, que pueden prevenir el cáncer al extirpar de pólipos precancerosos. Sin embargo, este progreso se ha desacelerado durante la última década con tendencias decrecientes que ahora se limitan a las personas de 65 años o más.

Para el informe, los investigadores utilizaron datos de incidencia disponibles hasta 2019 de 50 estados y del Distrito de Columbia del programa de Vigilancia, Epidemiología y Resultados Finales (SEER, por sus siglas en inglés) del Instituto Nacional del Cáncer y el Programa Nacional de Registros del Cáncer de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, de conformidad con la Asociación Norteamericana de Registros Centrales del Cáncer. El Centro Nacional de Estadísticas de Salud proporcionó los datos nacionales de mortalidad disponibles hasta 2020.

Otros hallazgos clave del informe incluyen:

- El progreso contra el CCR se ha desacelerado de una disminución en la incidencia y la mortalidad del 3% al 4% por año durante la década de 2000 al 1% por año para la incidencia y el 2% por año para la mortalidad durante la última década.
- La tasa de incidencia de CCR fue un 33% más alta en los hombres (41.5 por 100,000) que en las mujeres (31.2 por 100,000) durante 2015-2019, lo que probablemente refleja las diferencias en la prevalencia de los factores de riesgo, como el exceso de peso corporal, el consumo de carnes procesadas y el tabaquismo tradicional.
- Las tasas de incidencia decrecientes se limitan a las personas 65 años de edad en adelante desde 2011; las tasas de incidencia se han estabilizado en las edades de 50 a 64 años y han aumentado un 2% por año en las personas menores de 50 años, así como en las personas de 50 a 54 años.
- Los diagnósticos han cambiado a una enfermedad más avanzada; la proporción de cánceres que se encuentran en etapa regional (se han propagado a los ganglios linfáticos adyacentes, a órganos o tejidos) o en etapa distante (se han propagado a órganos/ganglios linfáticos distantes) aumentó de un mínimo del 52% a mediados de la década de 2000 al 60% en 2019 pese al aumento de las pruebas de detección.

- Las tasas de mortalidad por CCR han aumentado desde alrededor de 2005 en un 1% anual en las personas menores de 50 años y en un 0.6 % en las personas de 50 a 54 años.
- La incidencia de CCR es más alta en las personas que son nativos de Alaska (88.5 por 100,000), indios americanos (46.0 por 100,000) o negros (41.7 por 100,000; frente a 35.7 por 100,000 en los blancos); los patrones de mortalidad son similares, con tasas más altas en las personas que son nativos de Alaska (50.5 por 100,000), indios americanos (17.5 por 100,000) o negros (17.6 por 100,000; frente a 13.1 por 100.000 en los blancos).

“Tenemos que abordar por qué las tasas en los adultos jóvenes siguen teniendo una tendencia en la dirección equivocada”, dijo el [Dr. Ahmedin Jemal](#), vicepresidente principal, ciencia de vigilancia y equidad en salud de la Sociedad Americana Contra El Cáncer y autor principal del estudio. “Necesitamos invertir más en investigación para descubrir las causas de las tendencias crecientes y descubrir nuevos tratamientos para enfermedades en etapa avanzada a fin de reducir la morbilidad y la mortalidad asociadas con esta enfermedad en esta población joven, que está formando familias y brindando apoyo a otros miembros de la familia”.

“Estos datos sumamente preocupantes ilustran la necesidad urgente de invertir en estudios de investigación del cáncer dirigidos dedicados a la comprensión y prevención del inicio temprano del cáncer colorrectal”, dijo [Dr. Karen E. Knudsen](#), directora ejecutiva de la Sociedad Americana Contra El Cáncer. “El cambio al diagnóstico de la enfermedad más avanzada enfatiza también la importancia de las pruebas de detección y la detección temprana, lo que salva vidas”.

Autores de ACS, la [Dra. Nikita Wagle](#) y el [Dr. Robert Smith](#) también participaron en el estudio.

La edición de *Datos y estadísticas sobre el cáncer colorrectal 2023-2025* presenta una actualización importante de los informes complementarios de datos y estadísticas de ACS, que proporciona datos en un formato más conciso y fácil de usar y se puede encontrar aquí.


###

### **Acerca de la Sociedad Americana Contra El Cáncer**

La Sociedad Americana Contra El Cáncer es la principal organización en la lucha contra el cáncer con la visión de poner fin al cáncer tal como lo conocemos, para todos. Durante más de 100 años, hemos estado mejorando la vida de las personas con cáncer y sus familias como la única organización que lucha contra el cáncer a través de las políticas públicas, la investigación y el apoyo al paciente. Estamos comprometidos en garantizar que todos tengan la oportunidad de prevenir, detectar, tratar y sobrevivir al cáncer. Para informarse más al respecto, visite [cancer.org/es](https://cancer.org/es) o llámenos a nuestra línea telefónica de ayuda las 24 horas, los 7 días de la semana al 1-800-227-2345. Conéctese con nosotros en [Facebook](#), [Twitter](#) e [Instagram](#).

For further information: [Anne.Doerr@cancer.org](mailto:Anne.Doerr@cancer.org)

---

Additional assets available online:  [Photos \(1\)](#)